

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
КАЛЬЦЕКС

Регистрационный номер:

Торговое название: Кальцекс

МНН или группировочное название: Метенамина кальция хлорид

Лекарственная форма: таблетки.

Описание: Таблетки белого цвета, плоскоцилиндрические с риской и фаской, гигроскопичны.

Состав на одну таблетку:

Метенамина кальция хлорида декагидрат - 500 мг.

Вспомогательные вещества: тальк, кальция стеарат.

Фармакотерапевтическая группа

Противомикробное средство.

Код АТХ: [J01XX]

Фармакологическое действие

Действие этого комплексного препарата обусловлено его составляющими. Метенамин относится к классу антисептиков и дезинфицирующих средств, к группе альдегидов. Действие основано на способности препарата разлагаться в кислой среде с образованием формальдегида, который обладает в данном случае антисептическим и противовоспалительным свойствами.

Комплексная соль метенамина присутствует для восполнения дефицита ионов кальция, для уменьшения проницаемости сосудистой стенки (что характерно для любого воспаления).

Показания к применению

Симптоматическое лечение острых респираторных заболеваний и «простудных» заболеваний (в составе комплексной терапии). Препарат следует принимать взрослым при начальных симптомах простуды.

Противопоказания

Гиперчувствительность, гипоацидность желудочного сока, печеночная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, беременность, период лактации, детский возраст.

Способ применения и дозы

Внутрь, по 1-2 таблетки 3-4 раза в сутки. Курс лечения – 3-5 дней.

Побочные действия

Возможны диспепсические расстройства, при появлении которых прием препарата следует прекратить.

Передозировка

Симптомы: резкое раздражение конъюнктивы и слизистых оболочек дыхательных путей, диспепсические расстройства (тошнота, рвота, диарея), гломерулонефрит.

Лечение: рекомендуется прием тиоктовой кислоты, фолиевой кислоты, аскорбиновой кислоты, пиридоксина и препаратов никотиновой кислоты.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Форма выпуска

Таблетки 500 мг.

По 10 таблеток в контурную ячейковую упаковку. 1 или 2 контурные ячейковые упаковки вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Допускается укладывать контурные ячейковые упаковки с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку.

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

4 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель/Организация, принимающая претензии:

ОАО "Татхимфармпрепараты"

420091, Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, 260

(843) тел. 571-85-58; факс: 571-85-38.

E-mail: marketing@tatpharm.ru

Генеральный директор
ОАО «Татхимфармпрепараты»


 Н. Ханнанов

