

Инструкция
по применению лекарственного препарата
Полисорб МП

Регистрационный номер:

Торговое название препарата: Полисорб МП

Международное непатентованное название или группировочное название:

Кремния диоксид коллоидный

Лекарственная форма: порошок для приготовления суспензии для приема внутрь

Состав: кремния диоксид коллоидный

Описание:

Легкий белый или белый с голубоватым оттенком порошок без запаха. При взбалтывании с водой образует взвесь.

Фармакотерапевтическая группа: энтеросорбирующее средство.

Код АТХ : А07В

Фармакологические свойства.

Полисорб МП (медицинский пероральный) - неорганический, неселективный, полифункциональный энтеросорбент на основе высокодисперсного кремнезема с размерами частиц до 0,09 мкм, с химической формулой SiO_2 . Сорбционная емкость препарата при внутреннем употреблении равна $300 \text{ м}^2/\text{г}$.

Фармодинамика.

Полисорб МП обладает выраженными сорбционными свойствами и детоксикационными свойствами. В просвете желудочно-кишечного тракта препарат связывает и выводит из организма эндогенные и экзогенные



токсические вещества различной природы, включая патогенные бактерии и бактериальные токсины, антигены, пищевые аллергены, лекарственные препараты и яды, соли тяжелых металлов, радионуклиды, алкоголь. Полисорб МП сорбирует также некоторые продукты обмена веществ организма, в том числе избыток билирубина, мочевины, холестерина и липидных комплексов, а также метаболиты, ответственные за развитие эндогенного токсикоза.

Фармакокинетика.

Полисорб МП не расщепляется и не всасывается в желудочно-кишечном тракте и выделяется в неизменном виде.

Показания к применению:

- острые и хронические интоксикации различного происхождения у взрослых и детей;
- острые кишечные инфекции любого генеза, включая пищевые токсикоинфекции, а также диарейный синдром неинфекционного происхождения, дисбактериоз (в составе комплексной терапии);
- гнойно-септические заболевания, сопровождающиеся выраженной интоксикацией;
- острые отравления сильнодействующим и ядовитыми веществами, в том числе лекарственными препаратами и алкоголем, алкалоидами, солями тяжелых металлов и др.;
- пищевая и лекарственная аллергия;
- и гипербилирубинемия (вирусный гепатит и другие желтухи) и гиперазотемия (хроническая почечная недостаточность)
- жителям экологически неблагоприятных регионов и работникам вредных производств, с целью профилактики.

Противопоказания:

- Язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки в фазе обострения;
- Кровотечения из желудочно-кишечного тракта;
- Атония кишечника;
- Индивидуальная непереносимость препарата.

Способ применения дозы.

Полисорб МП принимают внутрь только в виде водной суспензии!

Для получения суспензии необходимое количество препарата тщательно размешивают в 1/4 - 1/2 стакана воды. Рекомендуется готовить свежую суспензию перед каждым приемом препарата и выпивать ее за 1 час до еды или приема других лекарств.



[Handwritten signature]

Средняя суточная доза у взрослых 100-200 мкг/кг массы тела (6-12г).
 Препарат принимается в 3-4 приема в течение суток.
 Максимальная суточная доза у взрослых 330 мкг/кг массы тела (20 г).
 Доза для детей рассчитывается в зависимости от массы тела (см. таблицу).

Таблица подсчета суточной дозы Полисорба в зависимости от массы тела пациента.

Масса тела пациента в кг	Суточная доза в мг/кг		
	Минимальная	средняя	максимальная
10,0	1,0	1,5	2,0
15,0	1,5	2,25	3,0
20,0	2,0	3,0	4,0
25,0	2,5	3,75	5,0
30,0	3,0	4,5	6,0
40,0	4,0	6,0	8,0
50,0	5,0	7,5	10,0
60,0	6,0	9,0	12,0

1 чайная ложка Полисорба «с верхом» содержит 1г препарата, 1 столовая «с верхом» 2,5-3г.

В случаях пищевой аллергии препарат принимается непосредственно перед приемом пищи, точную дозу Полисорба разделяют в течение дня на три приема.

Длительность лечения зависит от диагноза и тяжести заболевания, курс лечения при острых интоксикациях 3-5 дней; при аллергических заболеваниях, хронических интоксикациях продолжительность лечения до 10-14 дней. Повторные курсы спустя 2-3 недели, по рекомендации врача.

Особенности применения Полисорба МП при различных заболеваниях.

1. Пищевая токсикоинфекция и острые отравления.

Начинать терапию рекомендуется с промывания желудка 0,5-1% взвесью Полисорба. При тяжелых отравлениях в первые сутки промывание желудка проводят через зонд каждые 4-6 часов, наряду с этим препарат дают внутрь. Разовая доза у взрослых может составлять 100-150 мг/кг массы тела больного по 2-3 раза в день.

2. Острые кишечные инфекции.



Рекомендуется начать лечение Полисорбом в первые часы или сутки заболевания в комплексе с другими способами лечения. В первые сутки-суточная доза дается в течение 5-ти часов с интервалами между приемами в 1 час. Во 2-е сутки - суточная доза дается в 4 приема в течение суток.

Продолжительность лечения 3-5 дней.

3. Лечение вирусного гепатита.

В комплексной терапии вирусного гепатита Полисорб применяют как детоксицирующее средство в обычных дозах в течение первых 7-10 дней болезни.

4. Аллергические заболевания.

При острых аллергических реакциях лекарственного или пищевого генеза рекомендуется предварительное промывание желудка и кишечника 0,5-1% взвесью Полисорба. Затем препарат дают в обычных дозах до наступления клинического эффекта. При хронических пищевых аллергиях рекомендуются курсы Полисорба по 7-10-15 дней, препарат принимают непосредственно перед едой. Аналогичные курсы показаны при острой рецидивирующей крапивнице и отеке Квинке, эозинофилии, на фоне обострения поллинозов и других атопий.

5. Хроническая почечная недостаточность.

Используют курсы лечения Полисорбом в суточной дозе 150-200 мг/кг тела в течении 25-30 дней с перерывом 2-3 недели.

Побочное действие.

Редко - аллергические реакции, диспепсия, запоры.

При длительном, более 14 дней, приеме Полисорба возможно нарушение всасывания витаминов, кальция, в связи с чем рекомендуется профилактический прием поливитаминных препаратов, кальция.

Взаимодействие с другими лекарствами.

Возможно снижение лечебного эффекта одновременно принимаемых внутрь лекарств.

Форма выпуска.

Порошок для приготовления суспензии для приема внутрь.

По 1, 2, 3, 6, 10 и 12 г в пакеты одноразового использования из бумаги этикеточной с термослоем. По 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, 50 или 100 пакетов одноразового использования вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. Допускается помещать одноразовые пакеты непосредственно в групповую упаковку, инструкции вкладываются согласно количеству пакетов.



[Handwritten signature]

По 50 г в пакеты двойные полиэтиленовые или по 5 кг, 10 кг в пакеты двойные полиэтиленовые (для стационаров). Пакет 50 г в картонную пачку. Также по 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 и 50 г в банки из полистирола, полиэтилена или полиэтилентерефталата, укупоренные крышками аналогичных материалов. Банку вместе с инструкцией в картонную пачку. Банки по 12 г допускается упаковывать в термоусадочную пленку по 5 и 10 штук, вкладывая инструкции соответственно количеству банок.

Срок годности.

5 лет.

Не использовать по окончании срока годности.

Условия хранения.

При температуре не выше 45°C.

После вскрытия упаковки хранить в плотно закрывающейся емкости.

Срок хранения водной взвеси не более 48 часов.

Условия отпуска из аптек.


Без рецепта.

Производитель/Адрес претензий по качеству: ЗАО «Полисорб», 454084, Челябинск, пр. Победы, 168

Тел.: (351) 278-19-89;

Тел/факс: (351) 247-91-26

Ген. директор ЗАО «Полисорб»



А.Н. Попилов

И.о. директора ИДКЭЛС



А.Н. Васильев

